

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ ПО
ПОКАЗАНИЯМ МНОГОШАРОВОГО СПЕКТРОМЕТРА
БОННЕРА МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ СПЕКТРА ПО
ПОЛИНОМАМ ЛЕЖАНДРА С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ТИХОНОВА**

Чижов К.А.

*Лаборатория радиационной биологии, Объединённый институт ядерных
исследований, Дубна
kchizhov@jinr.ru*

Для восстановления спектра нейтронов в широком диапазоне энергий от 10^{-8} до 10^3 МэВ по показаниям многошарового спектрометра Боннера необходимо решить интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода. В работе представлен метод решения данного уравнения, основанный на разложении спектра нейтронов по смешенным полиномам Лежандра с применением регуляризации Тихонова. В качестве примера анализируется задача восстановления спектров нейтронов для "мягкого" и "жёсткого" опорных полей на фазотроне ОИЯИ. Предложенный метод актуален для целей обеспечения радиационной безопасности персонала за защитными экранами на ускорителях и реакторах.